1. HILFE GUIDE FÜR IHREN HUND

Akute Maßnahmen

Sofort-Hilfe im Notfall

1 SICHERHEIT!
- Hund beruhigen
- Sich selbst vor Verletzungen schützen

2 SOFORT HANDELN!
- Aus Gefahrenzone entfernen
- Hund stabilisieren
- Tierarzt verständigen

ERNSTFALL ÜBEN – 1. HILFE KURS FÜR HUNDE MITMACHEN!

3 ERSTE HILFE!
- Vitalfunktionen erhalten

4 TRANSPORT ZUM TIERARZT!
- Hund transportfähig machen

Reanimation

ATEMWEGE

MÜSSEN FREI SEIN!

- Kopf strecken, Zunge hervorziehen
- Erbrochenes oder Fremdkörper entfernen

BEATMEN

- Nase und Maul mit der Hand fest umfassen
- Tief einatmen, Mund auf Nasenöffnung setzen, kräftig ausatmen
- Wiederholen, Beatmung 10 - 20 x pro Minute

CIRCULATION (KREISLAUF)

- Kein Herzschlag? Sofort Herzmassage starten
- Stoßartiger Druck auf Herzfeld mit anschließender Entlastung in einer Frequenz von etwas mehr als 1x pro Sekunde

Vitalwerte

PULSFREQUENZ

- **KLEINE HUNDE:**
  100/120 Herzschläge/Minute
- **GROßE HUNDE:**
  80-100 Herzschläge/Minute

HOHER PULSWERT
Normal bei jungen und aufgeregten Tieren, bei kleinen oder trächtigen Hunden oder am Abend

ATMUNG

- **KLEINE HUNDE:**
  18-30 Atemzüge/Minute
- **GROßE HUNDE:**
  14-22 Atemzüge/Minute

ERHÖHUNG DER ATEMFREQUENZ
durch Aufregung, Stress, Anstrengung, Wetter

HERZSCHLAG/MINUTE

- Am Innenschenkel Oberschenkelschlagader in der Beinfalte suchen
- Mit den Fingerspitzen von Zeige- und Mittelfinger Schlagader ertasten
- 15 Sekunden Pulsschläge mitzählen und Ergebnis mal 4 nehmen

Messung der Körpertemperatur

METHODE

- Thermometerspitze mit Vaseline oder Öl gleitfähiger machen
- Schwanz hochheben
- Thermometer etwa 2 cm tief in den After einführen
- Thermometer festhalten
- Dauer der Messung hängt vom jeweiligen Thermometer ab

ALTERNATIVE ANWENDUNG:
normales Ohrthermometer

NORMWERTE

- Welpen bis 39,5°
- Erwachsene Hunde 37,5° - 39°

Kontrolle der Schleimhäute

FINGER 3 SEKUNDEN AN EINER STELLE GEDRÜCKT HALTEN UM VERÄNDERUNGEN ZU ERKENNEN!

VERÄNDERUNGEN

- Die Farbe der Maulschleimhaut ist beim gesunden Hund an den unpigmentierten Stellen rosa, glatt, glänzend, feucht.
- Farbveränderungen (Rötungen, Blässe, bläuliche Färbung) oder Ablagerungen sind Krankheitsanzeichen!

OK Rosa: Gesund

Blass: Schock, Blutarmut

Blau: Sauerstoffmangel

Grau: Vergiftung

Gelb: Leberproblem

ALTERNATIV:
Kontrolle an der Nickhaut

Transport des verletzten Hundes

GEWUSST WIE?

- **KLEINE HUNDE** in Tragebox oder Korb transportieren
- **DECKE ALS TRAGE**
  Transport wie in Hängematte durch zwei Personen
- **HUND AUF ARMEN TRAGEN**
  Mit der verletzten Seiten vom Körper abgewandt Gliedmaßen mit Knochenbrüchen hängen lassen
- **BEI WIRBELSÄULENVERLETZUNG**
  (Tiere laufen unkoordiniert, sind gelähmt, lassen Harn ab) Hund darf nicht durchhängen und nicht bewegt werden, um weitere Verletzungen zu vermeiden!

Transport des bewusstlosen Hundes

1

Maul ist tiefster Punkt des flach liegenden Hundes - Erbrochenes und Blut laufen so am besten ab

2

Bei Ohnmacht: Kopf überstrecken, Maul öffnen, Zunge heraus ziehen

3

Bei Kreislaufschock: hinteren Teil des Hundes höher lagern

4

Kopf und Wirbelsäule in gerade Linie bringen, Vorder- und Hinterläufe auseinander ziehen

5

Hund in stabile Seitenlage bringen um Atemwege freizuhalten

GGF. MIT THERMODECKE (GOLDFOLIE) VOR AUSKÜHLUNG SCHÜTZEN

TRANSPORT ZUM TIERARZT IN STABILER SEITENLAGE

Knochenbruch – Bruch schienen

MATERIAL FÜR SCHIENE
zusammengerollte Zeitung
Stock, Holzstab

VERBANDSMATERIAL
Watte zum Polstern,
lange Binde

SCHIENEN

- Fixierung muss weit oberhalb und unterhalb der Bruchstelle enden
- Bereich um die Bruchstelle grossräumig polstern
- Polsterung mit Binde umwickeln und fixieren
- Schiene anlegen, mit Binde umwickeln und fixieren
- Bandage nicht zu fest binden

SOFORT ZUM TIERARZT!

Knochenbruch – offener Knochenbruch

SYMPTOME

- Sichtbare Behinderung wenn das Tier geht
- Unnormale Beweglichkeit: Bein baumelt herab
- Schwellung an der Bruchstelle
- Sichtbare, offene Wunde
- Knochen oder Knochenteile können sichtbar sein

SOFORT ZUM TIERARZT!

MAßNAHMEN

- Gebrochenes Gliedmaß ruhig stellen, damit sich die Wunde nicht verschlimmert
- Keine weitere Behandlung! Evtl. Maulkorb zum Schutz anlegen

WICHTIG!

Offene Knochenbrüche nicht schienen

Blutungen stillen und Druckverband anlegen

GEWUSST WIE?

- Wunde mit sterilem Vlies abdecken, Mullbinde auf Vlies drücken und fixieren
- Bei weiterer Blutung straffer wickeln, Druckpolster anlegen (z.B. Verbandspäckchen, Taschentücher)
- Verrutschen des Verbandes durch äußerliches Klebeband verhindern
- Gliedmaßen dürfen nicht anschwellen
- Bei anhaltender Blutung Blutgefäss direkt abdrücken, mit beiden Händen oberhalb der Wunde in Richtung des Herzens

SOFORT ZUM TIERARZT!

Notfall-Apotheke

UNTERWEGS

- Mull- oder Fixierbinden zur Wundversorgung, zum Fang zubinden, Behelfsleine, Druckverband
- Verbandstuch zur Wundversorgung

ADRESSLISTE TIERÄRZTE
CHIP-KENNUNG / TÄTO-NUMMER

ZU HAUSE

- Einweghandschuhe, Mullbinden, sterile Mulltupfer, Verbandswatte, Fixierpflaster, Verbandsschere
- Desinfektionsmittel, Wundsalbe, Tierkohle bei Durchfall und Vergiftung
- Ohrreinigungsmittel
- Einwegspritze ohne Kanüle
- Babysocken oder Hundeschuhe
- Zeckenzange/Pinzette
- Flohmittel/Insektenschutzmittel
- Fieberthermometer